

Entbänderung



Liebe/r _____ !

Ein Teil der "aktiven Behandlung" mit sichtbaren Veränderungen im Einzelkiefer ist nun abgeschlossen. Ab heute trägst Du die Verantwortung für Deine geraden Zähne selber.

Bisher haben wir mit einer festsitzenden Zahnspange Deine Zahnstellung verändert. Dabei wurde der Knochen von speziellen Zellen umgebaut und die Zähne wurden etwas locker; nun müssen Sie noch so lange stabilisiert werden, bis sie sich wieder verfestigt haben. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Wichtig ist nun eine **Lagekorrektur der Kiefer zueinander** zu erreichen. Erst diese Unterkieverschiebung mit großen Umbauvorgängen im Gesichtsbereich und Herstellen einer stabilen Front- und Seitenzahnverzahnung ist die Grundvoraussetzung dafür, das zukünftige Behandlungsergebnis auch dauerhaft zu sichern. Dazu ist Deine Mitarbeit zwingend erforderlich. **Die "Klammer" darf nicht unter 16 Stunden pro Tag getragen werden!**
- Wichtig ist jetzt noch eine stabile Feineinstellung der Front- und Seitenzahnverzahnung zu erreichen. Dazu ist Deine Mitarbeit zwingend erforderlich. **Die Klammer darf nicht unter 14 Stunden täglich getragen werden, soweit keine anderen Angaben gemacht werden.**
- Mitteilung falls Eltern geklebten Retainer ablehnen: Ohne geklebte Dauerretention ist leider mit einem Rezidiv, Rückfall in die anfängliche Zahnfehlstellung, zu rechnen, falls die Klammer nicht 16-18 Stunden täglich getragen wird.

LOHNT EIN SCHÖNES ERGEBNIS ALLE MÜHEN + ARBEIT?

Ein schönes Gebiß benötigt ein muskuläres und funktionelles Gleichgewicht zwischen den Weichgeweben (Lippen, Wangen, Zunge sowie der Muskulatur) und den Hartgeweben (Knochen, Zähne) am noch wachsenden Gesichtsschädel. Eine sichere Verzahnung der Seitenzähne und ein regelrechter Frontzahnüberbiß sind dazu erforderlich. **Ein Rückfall in die ursprüngliche Fehlstellung** ist sicher, wenn nicht konsequent mitgearbeitet wird. Eine besonders hohe Rückfallneigung besteht bei erblichen Einflüssen, Lutsch-, Schluck- und Pressanomalien. Dazu muß die Tragezeit individuell bestimmt werden. Es ist in Folge zu beachten, daß die "Klammer" spannungsfrei im Mund sitzt. Beim Auftreten von Druckstellen, bei zu straffem Sitz, Lockerung der Klebung sowie anderen Problemen sollte umgehend die Praxis aufgesucht werden.

Die herausnehmbare Klammer nach Entbänderung ist Stunden pro Tag zu tragen.

Wir wünschen Dir viel Erfolg mit Deiner neuen Spange und helfen Dir bei Problemen gerne weiter.

Dein Praxisteam